



薬剤部

～情報～

2020年10月



9月の採用薬品（常備薬品）

ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」

持続型赤血球造血刺激因子製剤

協和キリンフロンティア

【効】腎性貧血

【用】 【副】添付文書参照



9月の採用薬品（院外処方専用薬品）

プログラフカプセル1mg

免疫抑制剤

アステラス製薬

【効】 【用】 【副】添付文書参照

ロコイドクリーム0.1%

外用副腎皮質ホルモン剤

鳥居薬品

【効】 【用】 【副】添付文書参照

イリボーOD錠5μg

下痢型過敏性腸症候群治療剤

アステラス製薬

【効】 【用】 【副】添付文書参照



後発医薬品への変更（なくなり次第順次変更となります）

シュアポスト錠0.5mg → レパグリニド錠0.5mg「サワイ」
 レミニールOD錠4mg → ガランタミンOD錠4mg「武田テバ」
 レミニールOD錠8mg → ガランタミンOD錠8mg「武田テバ」
 レミニールOD錠12mg → ガランタミンOD錠12mg「武田テバ」

採用区分変更薬品

セフトジジム静注用1g「マイラン」	常備薬品	→	注文薬品
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	常備薬品	→	院外専用薬品
ラベプラゾールNa錠10mg「NP」	常備薬品	→	院外専用薬品
(ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」へ名称変更予定)			
ガバペン錠200mg	常備薬品	→	特定個人薬品
グリマック配合顆粒	常備薬品	→	削除薬品

9月の採用薬品（特定個人薬品）

ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）

漢方製剤

ツムラ

【効】冷え症のもの次の諸症：

慢性湿疹（分泌物の少ないもの）、かゆみ

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は

食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）

漢方製剤

ツムラ

【効】化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、

急性湿疹、水虫

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は

食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ノイロビタン配合錠

VB1・VB2・VB6・VB12配合剤

LTLファーマ

【効】1. 本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、

食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、

妊産婦、授乳婦等）

2. 下記疾患のうち、本剤に含まれるビタミン類の欠乏又は

代謝障害が関与すると推定される場合：神経痛、筋肉痛・関節痛、

末梢神経炎・末梢神経麻痺

効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

【用】通常成人1日1～3錠を経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



トピナ錠50mg

抗てんかん剤

協和キリン

【効】他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない

てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）

に対する抗てんかん薬との併用療法

【用】 【副】添付文書参照

