



## 新規特定個人採用薬

・ **ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL**  
**合成副腎皮質ホルモン剤** ブリストル・マイヤーズスクイブ



【効】 【用】 【副】 添付文書参照

・ **デュピクセント皮下注300mgペン**  
**ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体** サノフィ



【効】 ○既存治療で効果不十分なアトピー性皮膚炎

○気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない重症又は難治の患者に限る)

○鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎(既存治療で効果不十分な患者に限る)

【用】 <アトピー性皮膚炎> : 通常, 成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し, その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。  
 <気管支喘息> : 通常, 成人及び12歳以上の小児にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として初回に600mgを皮下投与し, その後は1回300mgを2週間隔で皮下投与する。

<鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎> : 通常, 成人にはデュピルマブ(遺伝子組換え)として1回300mgを2週間隔で皮下投与する。なお, 症状安定後には, 1回300mgを4週間隔で皮下投与できる。

【副】 添付文書参照

## 院内採用薬(注文薬)

・ **シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」**  
**ニューキノロン系抗菌剤** Meiji Seikaファルマ



【効】 【用】 【副】 添付文書参照

・ **パントール注射液100mg**  
**パントノール製剤** トーアエイヨー



【効】 1.パントテン酸欠乏症の予防及び治療

2.パントテン酸の需要が増大し, 食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患, 甲状腺機能亢進症, 妊産婦, 授乳婦等)

3.下記疾患のうち,パントテン酸の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合

(1).ストレプトマイシン及びカナマイシンによる副作用の予防及び治療

(2).接触皮膚炎, 急・慢性湿疹

(3).術後腸管麻痺

(上記3.に対して, 効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。)

【用】 【副】 添付文書参照

## 院外限定薬品採用

・ **デノタスチュアブル配合錠**(特定個人より変更)  
**カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤** 日東薬品工業



【効】 RANKL阻害剤(デノスマブ(遺伝子組換え)等)投与に伴う低カルシウム血症の治療及び予防

【用】 【副】 添付文書参照

・ **プロクトセディル軟膏**(2g入りチューブ)  
**痔疾治療剤** EAファーマ



【効】 痔核・裂肛の症状(出血, 疼痛, 腫脹, 痒感)の緩解, 肛門周囲の湿疹・皮膚炎

【用】 【副】 添付文書参照

・ **ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)**  
**漢方製剤** ツムラ



【効】 全身倦怠感があり, 口や舌が乾き, 尿が出しづるものの次の諸症: 残尿感, 頻尿, 排尿痛

【用】 【副】 添付文書参照

・ **ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療用)**  
**漢方製剤** ツムラ



【効】 関節痛, 神経痛, 筋肉痛

【用】 【副】 添付文書参照

## メーカー変更

・ アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「JG」→「日医工」  
 ・ ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」→ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」【院外限定】

## 採用変更

・ フェルビナクパップ70mg「オーハラ」 販売中止 (残18袋)  
 →セルタッチパップ70【院外限定】

## 名称変更

・ ペリオフィール歯科用軟膏2%→ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」

