



6月の採用薬品（特定個人薬品）

ストロメクトール錠3mg

駆虫剤

マルホ

【効】腸管糞線虫症、疥癬

【用】 【副】添付文書参照



ラタチモ配合点眼液「センジュ」

緑内障・高眼圧症治療剤

千寿製薬

【効】緑内障、高眼圧症

【用】1回1滴、1日1回点眼する。

【副】添付文書参照



ジーラスタ皮下注3.6mg

持続型G-CSF製剤

協和キリン

【効】 【用】

＜がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制＞

通常、成人にはがん化学療法剤投与終了後の翌日以降、ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）として、3.6mgを化学療法1サイクルあたり1回皮下投与する。

＜同種末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員＞

通常、成人にはペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）として、7.2mgを1回皮下投与する。

【副】添付文書参照



後発医薬品への変更

エディロールカプセル0.75μg → イルテカトールカプセル0.75μg 「トーワ」
 フェブリク錠10mg → フェブキソスタット錠10mg 「DSEP」
 フェブリク錠20mg → フェブキソスタット錠20mg 「DSEP」
 ロトリガ粒状カプセル2g → 木が 脂肪酸IPL粒状カプセル2g 「武田テバ」
 ロゼレム錠8mg → ラメルテオン錠8mg 「武田テバ」 (9月13日発売)

6月の採用薬品（院外専用薬品）

ビブラマイシン錠100mg

テトラサイクリン系抗生物質

ファイザー

【効】＜適応菌種＞

ドキシサイクリンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、炭疽菌、大腸菌、赤痢菌、肺炎桿菌、ペスト菌、コレラ菌、ブルセラ属、Q熱リケッチア（コクシエラ・ブルネティ）、クラミジア属

＜適応症＞

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、骨髄炎、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎（急性症、慢性症）、尿道炎、淋菌感染症、感染性腸炎、コレラ、子宮内感染、子宮付属器炎、眼瞼膿瘍、涙のう炎、麦粒腫、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、中耳炎、副鼻腔炎、歯冠周囲炎、化膿性唾液腺炎、猩紅熱、炭疽、ブルセラ症、ペスト、Q熱、オウム病

【用】通常成人は初日ドキシサイクリン塩酸塩水和物として1日量200mg（力価）を1回又は2回に分けて経口投与し、2日目よりドキシサイクリン塩酸塩水和物として1日量100mg（力価）を1回に経口投与する。

なお、感染症の種類及び症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



テリパラチドB S皮下注キット600μg「モチダ」

骨粗鬆症治療剤

持田製薬


【効】骨折の危険性の高い骨粗鬆症

【用】通常、成人には1日1回テリパラチド（遺伝子組換え）〔テリパラチド後続1〕として200μgを皮下に注射する。

なお、本剤の投与は24ヵ月間までとすること。

【副】添付文書参照

※フォルテオ皮下注キット600μgのバイオ後続品



採用区分変更薬品

リバスタッチパッチ13.5mg、18mg 特定個人薬品 → 院外専用薬品