



9月の採用薬品

パキロビッドパック600、300

抗ウイルス剤

ファイザー

600



300



【効】SARS-CoV-2による感染症

【用】通常、成人及び12歳以上かつ体重40kg以上の小児には、ニルマトレビルとして1回300mg及びリトナビルとして1回100mgを同時に1日2回、5日間経口投与する。

【副】添付文書参照

フルービックHAシリンジ

インフルエンザHAワクチン

一般財団法人阪大微生物病研究会



【効】インフルエンザの予防

【用】6ヶ月以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2～4週間の間隔をおいて2回注射する。13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1～4週間の間隔をおいて2回注射する。

【副】添付文書参照

※個包装のプレフィルドシリンジのため、従来のバイアルよりも管理しやすく、かつ分注操作も不要

9月の採用薬品（注文薬品）

ナフトピジルOD錠2.5mg「YD」

前立腺肥大症排尿障害改善剤

陽進堂



【効】前立腺肥大症に伴う排尿障害

【用】 【副】添付文書参照

採用薬品のメーカー変更

アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 → 「SW」

亜鉛華（10%）単軟膏「ホエイ」 → 「シオエ」

採用区分変更薬品

バラクルード錠0.5mg 特定個人薬 → 削除

ナフトピジル錠2.5mg「YD」 注文薬品 → 削除

9月の採用薬品（特定個人薬品）

エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」

抗ウイルス化学療法剤

沢井製薬



【効】B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が

確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制

【用】本剤は、空腹時（食後2時間以降かつ次の食事の2時間以上前）に経口投与する。

通常、成人にはエンテカビルとして0.5mgを1日1回経口投与する。なお、ラミブジン不応（ラミブジン投与中にB型肝炎ウイルス血症が認められる又はラミブジン耐性変異ウイルスを有するなど）患者には、エンテカビルとして1mgを1日1回経口投与することが推奨される。

【副】添付文書参照

レブラミドカプセル5mg

抗造血管悪性腫瘍剤

ブリistol・マイヤーズスクイブ



【効】 【用】

<多発性骨髄腫>：

デキサメタゾンとの併用において、通常、成人にはレナリドミドとして1日1回2.5mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

<5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形成症候群>：

通常、成人にはレナリドミドとして1日1回1.0mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

<再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫>：

通常、成人にはレナリドミドとして1日1回2.5mgを連日経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。

<再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫>：

リツキシマブ（遺伝子組換え）との併用において、通常、成人にはレナリドミドとして1日1回2.0mgを21日間連日経口投与した後、7日間休薬する。これを1サイクルとして最大12サイクルまで投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。

【副】添付文書参照

