



1月の採用薬品

ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」

キャンディン系抗真菌剤

沢井製薬

【効】○アスペルギルス属及びカンジダ属による下記感染症：
真菌血症、呼吸器真菌症、消化管真菌症
○造血幹細胞移植患者におけるアスペルギルス症及びカンジダ症の予防
【用】【副】添付文書参照



ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」

ニトログリセリン注射液

トーアエイヨー

【効】1. 手術時の低血圧維持
2. 手術時の異常高血圧の救急処置
3. 急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）
4. 不安定狭心症
【用】【副】添付文書参照



モンテルカスト錠10mg「トーワ」

気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤

東和薬品

【効】【用】
<気管支喘息>：通常、成人にはモンテルカストとして10mgを1日1回就寝前に経口投与する。
<アレルギー性鼻炎>：通常、成人にはモンテルカストとして5～10mgを1日1回就寝前に経口投与する。
【副】添付文書参照
※モンテルカスト錠10mg「トーワ」は一包化可能です



採用薬品のメーカー変更

アカルボースOD錠100mg「テバ」 → 「NIG」

削除薬品

ファンガード点滴用50mg
モンテルカスト錠10mg「KM」

1月の採用薬品（特定個人薬品）

グリクラジド錠20mg「トーワ」

血糖降下剤

東和薬品

【効】インスリン非依存型糖尿病（成人型糖尿病）
（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）
【用】グリクラジドとして、通常成人では1日40mgより開始し、1日1～2回（朝又は朝夕）食前又は食後に経口投与する。維持量は通常1日40～120mgであるが、160mgを超えないものとする。
【副】添付文書参照



ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）

漢方製剤

ツムラ

【効】関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛
【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
【副】添付文書参照



エクラープラスター20µg/cm²

外用副腎皮質ホルモン剤

久光製薬

【効】【用】【副】添付文書参照



1月の採用薬品（院外専用薬品）

タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」

セロトニン作動性抗不安剤

共和薬品工業

【効】神経症における抑うつ、恐怖心身症（自律神経失調症、本態性高血圧症、消化性潰瘍）における身体症候ならびに抑うつ、不安、焦躁、睡眠障害
【用】【副】添付文書参照

