



## 3月の採用薬品（限定採用薬品）

### トリンテリックス錠 10mg

セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤

武田薬品工業株式会社

【効】うつ病・うつ状態

【用】通常、成人にはボルチオキセチンとして10mgを1日1回経口投与する。なお、患者の状態により1日20mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて行うこと。

【副】添付文書参照



### ダラシンカプセル 150mg

リンコマイシン系抗生物質

ファイザー株式会社

【効】

< 適応菌種 >

クリンダマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌

< 適応症 >

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、涙囊炎、麦粒腫、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、顎炎、猩紅熱

【用】通常、成人はクリンダマイシン塩酸塩として1回150mg（力価）を6時間ごとに経口投与、重症感染症には1回300mg（力価）を8時間ごとに経口投与する。

小児には体重1kgにつき、1日量15mg（力価）を3～4回に分けて経口投与、重症感染症には体重1kgにつき1日量20mg（力価）を3～4回に分けて経口投与する。ただし、年齢、体重、症状等に応じて適宜増減する。

【副】添付文書参照



### アレジオンL X点眼液 0.1%

抗アレルギー点眼剤

参天製薬株式会社

【効】アレルギー性結膜炎

【用】通常、1回1滴、1日2回（朝、夕）点眼する。

【副】添付文書参照



## 3月の採用薬品（限定採用薬品）

### アレジオン眼瞼クリーム 0.5%

持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤

参天製薬株式会社

【効】アレルギー性結膜炎

【用】通常、適量を1日1回上下眼瞼に塗布する。

【副】添付文書参照



### プロメライン軟膏 5万単位/g

壊死組織除去剤

ジェイドルフ製薬株式会社

【効】熱傷・褥瘡・表在性各種潰瘍・挫傷・切開傷・切断傷・化膿創などの創傷面の壊死組織の分解、除去、清浄化およびそれに伴う治癒促進

【用】ガーゼ、リントなどに適量の軟膏をのばし、潰瘍辺縁になるべく触れないようにして塗布。1日1回交換する。

創傷面が清浄化し、新生肉芽組織の再生が認められた場合は使用を中止する。

【副】添付文書参照



## 採用区分変更薬品

限定薬品 → 注文薬品

ツムラ治打撲一方エキス顆粒

ツムラ麻子仁丸エキス顆粒

## 期限切迫薬品

2026年4月 トラベルミン配合錠

2026年4月 パンテチン散 20%「N I G」

2026年4月 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「J G」

2026年5月 ボルタレンサポ 25mg

2026年5月 メイアクトMS錠 100mg

2026年5月 セフォチアム塩酸塩点滴静注用 1g バッグ「N P」

## 3月の削除薬品：

セフジニルカプセル 100mg「J G」

（臨時採用薬：セフゾンカプセル100mgを通常採用薬とする）

