




薬剤部

～情報～

2026年 8 月



7月の採用薬品（限定採用薬品）

レトロゾール錠 2.5 mg「F」

アロマトーゼ阻害剤

富士製薬工業

【効】【用】

< 閉経後乳癌 > :

通常、成人にはレトロゾールとして1日1回2.5 mgを経口投与する。

< 生殖補助医療における調節卵巣刺激、多のう胞性卵巣症候群における排卵誘発、原因不明不妊における排卵誘発 > :

通常、レトロゾールとして1日1回2.5 mgを月経周期3日目から5日間経口投与する。十分な効果が得られない場合は、次周期以降の1回投与量を5 mgに増量できる。

【副】添付文書参照



ベリキューボ錠 2.5 mg

慢性心不全治療剤

バイエル薬品

【効】慢性心不全:

ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

【用】通常、成人にはベルイグアトとして、1回2.5 mgを1日1回食後経口投与から開始し、2週間間隔で1回投与量を5 mg及び10 mgに段階的に増量する。なお、血圧等患者の状態に応じて適宜減量する。

【副】添付文書参照



ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】比較的体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症:

排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ

【用】通常、成人1日7.5 gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



採用区分変更薬品

限定採用薬品 → 注文薬品

ツムラ疎経活血湯エキス顆粒、ツムラ八味地黄丸エキス顆粒

7月の採用薬品（限定採用薬品）

ツムラ参蘇飲エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】感冒、せき

【用】通常、成人1日7.5 gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



エゼロス配合錠 H D「サワイ」

小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／

HMG-C o A還元酵素阻害剤配合剤

沢井製薬株式会社

【効】高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症

【用】通常、成人には1日1回1錠（エゼチミブ／ロスバスタチンとして10 mg／2.5 mg又は10 mg／5 mg）を食後に経口投与する。

【副】添付文書参照



グリミクロン H A錠 20 mg

S U系経口血糖降下剤

住友ファーマ株式会社

【効】インスリン非依存型糖尿病（成人型糖尿病）

（ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。）

【用】グリクラジドとして、通常成人では1日40 mgより開始し、1日1～2回（朝又は朝夕）食前又は食後に経口投与する。維持量は通常1日40～120 mgであるが、160 mgを超えないものとする。

【副】添付文書参照



コートロシン注射用 0.25 mg

合成 A C T H製剤

アルフレッサファーマ

【効】副腎皮質機能検査

【用】【副】添付文書参照



7月の削除薬品:

フェマール錠2.5mg

