



# 薬剤部 ～情報～

2022年9月



September 9

8月の採用薬品はありません。

## ★ビグアナイド系糖尿病薬とヨード造影剤との併用注意について

ヨード造影剤を使用する検査の場合、ビグアナイド系糖尿病薬は検査前の一時中止、検査後2日間（48時間）が推奨されています。他施設での治療薬も含めて検査前に確認をお願いします。配合薬も販売されていますのでご注意ください。

### 【ビグアナイド系糖尿病薬一覧】

メトグルコ錠	メトホルミン塩酸塩錠 「日医工」	メトホルミン塩酸塩錠 「三和」	メトホルミン塩酸塩錠 「ニプロ」	メトホルミン塩酸塩錠 「トーフ」	メトホルミン塩酸塩錠 「ファイザー」	メトホルミン塩酸塩錠 「DSEP」
 250mg	 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT
 500mg	 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT
メトホルミン塩酸塩錠 「TE」	メトホルミン塩酸塩錠 「明治」	メトホルミン塩酸塩錠 「JG」	メトホルミン塩酸塩錠 「TCK」	メトホルミン塩酸塩錠 「DSPB」	エクメット配合錠	メタクト配合錠
 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT	 250mgMT	 LD	 LD
 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT	 500mgMT	 HD	 HD
メトアナ配合錠	イニシク配合錠	グリコラン錠	メトホルミン塩酸塩錠 「トーフ」	メトホルミン塩酸塩錠 「SN」	ジベトス錠	ブホルミン塩酸塩 腸溶錠「KO」
 LD	 250mg	 250mg	 250mg	 250mg	 50mg	 50mg
 HD	 500mg	 500mg	 500mg	 500mg	 50mg	 50mg

### ビグアナイド系糖尿病薬とヨード造影剤の併用について【併用注意】（添付文書より抜粋）

ヨード造影剤を用いて検査を行う患者においては、本剤の併用により乳酸アシドーシスを起こすことがあるので、検査前は本剤の投与を一時的に中止すること（ただし、緊急に検査を行う必要がある場合を除く）。

ヨード造影剤投与後4～8時間は本剤の投与を再開しないこと。なお、投与再開時には、患者の状態に注意すること。

