



3月の採用薬品

ホスリボン配合顆粒

経口リン酸製剤

ゼリア新薬工業

【効】低リン血症

【用】通常、リンとして1日あたり20～40mg/kgを目安とし、数回に分割して経口投与する。以後は患者の状態に応じて適宜増減するが、上限はリンとして1日あたり3,000mgとする。

【副】添付文書参照



3月の採用薬品（限定採用薬品）

乳酸カルシウム「VTRS」原末

カルシウム剤

ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

【効】○低カルシウム血症に起因する下記症候の改善
テタニー

○下記代謝性骨疾患におけるカルシウム補給

妊婦・産婦の骨軟化症

○発育期におけるカルシウム補給

【用】乳酸カルシウム水和物として、通常成人1回1gを1日2～5回経口投与する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

※同一成分の乳酸カルシウム「ケンエー」が供給停止のため



ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」

気道粘液溶解剤

武田テバファーマ株式会社

【効】○経口投与と困難な場合における下記疾患ならびに状態の去瘀
肺結核、塵肺症、手術後

○気管支造影後の造影剤の排泄の促進

【用】通常成人には1回1～2管（ブロムヘキシン塩酸塩として4～8mg）を1日1～2回筋肉内又は静脈内に注射する。

なお、年齢、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照

※同一成分のビソルボン注が供給停止のため



3月の採用薬品（限定採用薬品）

ツムラ117茵ちん五苓散エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症：

嘔吐、じんましん、二日酔のむかつき、むくみ

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



ツムラ47釣藤散エキス顆粒

漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



採用区分変更薬品

テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	限定採用薬品	→	注文薬品
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	限定採用薬品	→	注文薬品
ジクトルテープ75mg	限定採用薬品	→	注文薬品
リンデロン錠0.5mg	通常採用薬品	→	限定採用薬品
ココアテープ	通常採用薬品	→	限定採用薬品
MS冷シップ「タイホウ」	通常採用薬品	→	限定採用薬品
ビソルボン注4mg	通常採用薬品	→	限定採用薬品
アルチバ静注用2mg	通常採用薬品	→	削除薬品

院内医薬品集の使用方法（電子カルテ）

①ナビゲーションマップ → ②部門 → ③医薬品集 → ④薬品名入力 → ⑤検索

The screenshots illustrate the process of searching for drugs in the electronic medical record system. Step 1 shows the navigation map with 'Department' (部門) selected. Step 2 shows the department menu with 'Pharmacy' (薬剤) selected. Step 3 shows the drug collection menu with 'Drug Collection' (医薬品集) selected. Step 4 shows the drug name input field where 'Bisoprolol' (ビソルボン) is entered. Step 5 shows the search results page.

(④薬品名入力 → Enterキーでも可)