



## 5月の採用薬品

### ミールビック 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

阪大微生物病研究会

【効】麻しん及び風しんの予防

【用】本剤を添付の溶剤（日本薬局方注射用水）0.7mLで溶解し、通常、その0.5mLを1回皮下に注射する。

【副】添付文書参照



## 5月の採用薬品（限定採用薬品）

### リフキシマ錠200mg 難吸収性リファマイシン系抗菌剤

あすか製薬株式会社

【効】肝性脳症における高アンモニア血症の改善

【用】通常、成人及び小児にはリファキシミンとして1回400mgを1日3回食後に経口投与する。

【副】添付文書参照



### ツムラ109小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】咽喉がはれて痛む次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



### ツムラ122排膿散及湯エキス顆粒 漢方製剤

株式会社ツムラ

【効】患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、せつ、面疔、その他せつ腫症

【用】通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

【副】添付文書参照



5月の削除薬品：なし



## 5月の採用薬品（限定採用薬品）

### メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」 糖尿病用剤

トーアエイヨー株式会社

【効】＜2型糖尿病＞

ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られない場合に限る。

（1）食事療法・運動療法のみ

（2）食事療法・運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

＜多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発、多嚢胞性卵巣症候群の生殖補助医療における調節卵巣刺激＞

ただし、肥満、耐糖能異常、又はインスリン抵抗性のいずれかを呈する患者に限る。

【用】【副】添付文書参照



### エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーフ」 骨粗鬆症治療剤

東和薬品株式会社

【効】骨粗鬆症

【用】通常、成人にはエルデカルシトールとして1日1回0.75μgを経口投与する。ただし、症状により適宜1日1回0.5μgに減量する。

【副】添付文書参照



### チラーヂンS錠25μg 甲状腺ホルモン剤

あすか製薬株式会社

【効】【用】【副】添付文書参照



### エンレスト錠200mg アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬

ノバルティスファーマ株式会社

【効】【用】【副】添付文書参照



## 採用区分変更薬品

ガラントミンOD錠8mg「DSEP」	通常採用薬品	→	限定採用薬品
ファンギゾンシロップ100mg/mL	通常採用薬品	→	限定採用薬品
ハルシオン0.25mg錠	通常採用薬品	→	注文薬品
乾燥まむし抗毒素"化血研"	通常採用薬品	→	注文薬品